

TOP 5 DÔVODOV, PREČO NIEKTORÍ ĽUDIA ODMIETAJÚ OČKOVANIE

Podrobnejšie informácie nájdete v texte v statuse

1.



„Vakcíny boli vyvinuté príliš rýchlo.“

- Vedci na vývoji mRNA vakcín pracovali už desaťročia.
- Testovanie vakcín bolo zjednodušené administratívne, ale rovnako **prísne z hľadiska bezpečnosti**.
- Podmienečná registrácia je bežná (v SR ju má 114 liekov).

2.



„Bojím sa vedľajších účinkov.“

- Evidujeme **4 úmrtia** súvisiace s očkovaním.
- Pre porovnanie: **12 541 úmrtí na Covid** v SR.
- Na celom svete bolo zaočkovaných vyše **2 miliardy ľudí** a všetky krajiny v očkovaní pokračujú.



„Obávam sa očkovania kvôli mojim chorobám.“

- Kontraindikácia pre očkovanie proti Covidu je **veľmi málo**.
- Väčšina ochorení nie je dôvodom prečo sa neočkovať, ale naopak, sú dôvodom prečo sa očkovať čo najskôr.



„Bojím sa neznámych dlhodobých účinkov.“

- Dlhodobé účinky sú pri vakcínach vo všeobecnosti **raritné**.
- Účinná látka vakcíny z tela zmizne **po pár dňoch**.



„Som mladý a zdravý, načo sa očkovat?“

- Riziká Covidu sú aj pri mladých vyššie ako riziká očkovania.
- Mnohých mladých trápi **dlhodobé následky po Covide**.
- Očkujeme sa **nielen kvôli sebe**, ale aj pre ochranu okolia.

Riziká pri Covide a kontraindikácie k očkovaniu

	Zvyšuje riziko tŕžkého priebehu Covidu	Je kontraindikáciou (prekážkou) proti očkovaniu
onkologické ochorenia	ÁNO	NIE
kardiovaskulárne ochoarenia	ÁNO	NIE
zápalové reumatické ochorenia	ÁNO	NIE
chronické neurologické ochorenia	ÁNO	NIE
chronické kožné ochorenia	ÁNO	NIE
chronické ochorenia pečene	ÁNO	NIE
diabetickí pacienti	ÁNO	NIE
chronická choroba obličiek	ÁNO	NIE
chronické respiračné ochorenia	ÁNO	NIE
obezita	ÁNO	NIE
tehotenstvo	ÁNO	NIE
závažná forma alergie na jednu zo zložiek vakcíny	NIE	ÁNO

OČKOVANIE

COVID-19

4

úmrtia v súvislosti
s očkovaním v SR



655

hlásených závažných
vedľajších účinkov v SR



12 527

úmrtí na Covid v SR
(+2456 úmrtí "s Covidom")

49 493

hospitalizácií s Covidom
v SR



13,7%

Ľudí po prekonaní Covidu
pociťuje dlhodobé ťažkosti



0,31%

pravdepodobnosť myokarditídy
pri Covide

12€

cena vakcíny
od Pfizeru



2089€

náklady na hospitalizáciu
pacienta s Covidom



MINISTERSTVO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

— DlhodobeVedlajsieUcinky copy_resized_20210921_045229544.jpg —

DLHODOBÉ (VEDĽAJŠIE) ÚČINKY

VAKCÍNA

Všetky vedľajšie účinky z príbalového letáka sú krátkodobé.

Dlhodobé vedľajšie účinky sú pri vakcínach **rarietný jav**.

Pri žiadnej z 82 vakcín registrovaných v SR nedošlo k spätej deregistrácii kvôli neskôr sa objavujúcim vedľajším účinkom.

Rôzne mRNA vakcíny sa na dobrovoľníkoch testujú posledné 3 roky, nie je známy žiadny prípad **dlhodobých vedľajších účinkov**.

COVID-19

Časť ľudí pocituje **dlhotrvačné symptómy** a ťažkosti aj po vyliečení.

Podľa štúdie publikovanej v Lancete, až 76 percent hospitalizovaných s Covidom mali pretrvávajúce príznaky aj 6 mesiacov po vyliečení.

Podľa štúdie austrálskych vedcov, 56 percent pacientov malo **poškodené pluca aj tri mesiace** po prepustení z nemocnice.

Zatiaľ nie je úplne jasné, ako dlho môžu následky Covidu pretrvávať, a či v niektorých prípadoch nebudú **trvalé**.



 MINISTERSTVO
ZDRAVOTNICTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kto sa môže a kto sa nemôže očkovať proti Covidu?

Kto sa môže očkovať

✓ Všetci nad 12 rokov vrátane:

Ľudí s onkologickými ochoreniami, s kardiovaskulárnymi ochoreniami, s kožnými ochoreniami, s celiakiou, s ochoreniami pečene, s klasickými alergiami (na potraviny atď.), s rôznymi formami potravinových intolerancií, so zápalovými reumatickými ochoreniami, s chronickými respiračnými ochoreniami, s chronickými neurologickými ochoreniami, s imunodeficienciami, s prekonaným Covidom (14 dní po), diabetických pacientov, astmatikov...

V skratke: očkovať sa môžu všetci ľudia nad 12 rokov s akýmkoľvek chorobami a problémami, okrem:

Kto sa nemôže očkovať

- ✗ Ľudia s alergiou na niektorú zo zložiek vakcín
(napr. polyetylénglykom, polysorbát 80, trometamol)
- ✗ pacienti vo fáze akútneho zhoršovania chronickej choroby
(dočasná kontraindikácia, očkovanie sa odkladá)
- ✗ Ľudia s akútnym febrilným ochorením
(dočasná kontraindikácia, očkovanie sa odkladá)
- ✗ v prípade závažnej alergickej reakcie po 1. dávke
(trvalá kontraindikácia, očkovanie sa neodporúča)



Slovenská spoločnosť alergológie
a klinickej imunológie

